

基本情報

レジメンコード	110432		
レジメン名	R-Bendamustine(2サイクル目以降 2日間)再発・難治性		
癌腫	CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫		
申請診療科	血液内科	1サイクルの期間	21日間
併用内服薬	ロラタジン10mg・カロナール400mg(d1:リツキシマブ投与30分前)		
注意事項	トレアキシンは調製後3時間以内に投与終了すること		

薬剤情報

滴下順	薬剤名	投与量	投与日	投与方法
Rp.1	グラニセトロン点滴静注1mg/50mL	1袋	d1	30分点滴静注
Rp.2	トレアキシン注	90mg/m <sup>2</sup>	d1	1時間点滴静注
	生食注250mL	1袋		
	注射用水100mL	溶解用		
Rp.3	生食注50mL	1V	d1	5分点滴静注
Rp.4	生食注100mL	1V	d1	30分点滴静注
	水溶性ブレドニン20mg	2A		
Rp.5	リツキシマブ注	375mg/m <sup>2</sup>	d1	100mL/h → 200mL/h
	生食注	リツキシマブ 10倍希釈量		
Rp.1	グラニセトロン点滴静注1mg/50mL	1袋	d2	30分点滴静注

Rp.2	トリアキシン注	90mg/m <sup>2</sup>	d2	1時間点滴静注
	生食注250mL	1V		
	注射用水100mL	溶解用		
Rp.3	生食注50mL	1V	d2	5分点滴静注