

基本情報

| | | | |
|---------|---|----------|------|
| レジメンコード | 110456 | | |
| レジメン名 | R-THP-COP | | |
| 癌腫 | CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫 | | |
| 申請診療科 | 血液内科 | 1サイクルの期間 | 21日間 |
| 併用内服薬 | カロナール400mg・ロラタジン10mg(d1:リツキシマブ投与30分前)、プレドニン100mg(d2-d6) | | |
| 注意事項 | | | |

薬剤情報

| 滴下順 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 |
|------|---------------------------|----------------------|-----|---|
| Rp.1 | 生食注100mL | 1V | d1 | 30分点滴静注 |
| | 水溶性プレドニン20mg | 2A | | |
| Rp.2 | リツキシマブ注 | 375mg/m ² | d1 | 初回25mL/h → 50mL/h → 100mL/h 2回目以降100mL/h →200mL/h |
| | 生食注 | リツキシマブ 10倍希釈量 | | |
| Rp.3 | ヘパリンNaロック用シリンジ1000単位/10mL | 1筒 | d1 | |

| | | | | |
|------|---------------------|----------------------|----|---------|
| Rp.1 | グラニセトロン点滴静注1mg/50mL | 1袋 | d2 | 30分点滴静注 |
| Rp.2 | テラルビシン注 | 50mg/m ² | d2 | 30分点滴静注 |
| | 5%ブドウ糖注射液100mL | 1V | | |
| Rp.3 | エンドキサン注 | 750mg/m ² | d2 | 2時間点滴静注 |
| | 生食注500mL | 1袋 | | |

| | | | | |
|------|---------|-------------------------------------|----|---------|
| Rp.4 | オンコビン注 | 1.4mg/m ² *上限2mg/body | d2 | 5分点滴静注 |
| | 生食注50mL | 1V | | |
| Rp.5 | 生食注50mL | 1V | d2 | 15分点滴静注 |