

基本情報

レジメンコード	114028		
レジメン名	Pola+BR（初回）療法		
癌腫	再発難治性のびまん性大細胞性B細胞リンパ腫		
申請診療科	血液内科	1サイクルの期間	21日間
併用内服薬	ロラタジン10mg・カロナル400mg(d1:リツキシマブ投与30分前)		
注意事項	トリアキシンは調製後3時間以内に投与終了すること		

薬剤情報

滴下順	薬剤名	投与量	投与日	投与方法
Rp.1	生食注100mL	1V	d1	30分点滴静注
	水溶性プレドニン20mg	2A		
Rp.2	リツキシマブ注	375mg/m <sup>2</sup>	d1	25mL/h →
	生食注	リツキシマブ 10倍希釈量		50mL/h → 100mL/h
Rp.3	生食注50mL	1V	d1	15分点滴静注

Rp.1	グラニセトロン点滴静注1mg/50mL	1袋	d2	30分点滴静注
Rp.2	トリアキシン注	90mg/m <sup>2</sup>	d2	1時間点滴静注
	生食注250mL	1袋		
Rp.3	注射用水100mL	溶解用	d2	30分点滴静注
	生食注100mL	1V		
Rp.4	水溶性プレドニン20mg	2A	d2	1.5時間点滴静注 *フィルター使用
	ポライビー点滴静注用	1.8mg/kg		
	注射用水20mL	溶解用		
	生食注100mL	1V		

Rp.5	生食注50mL	1V	d2	5分点滴静注
Rp.1	グラニセトロン点滴静注1mg/50mL	1袋	d3	30分点滴静注
Rp.2	トリアキシン注	90mg/m <sup>2</sup>	d3	1時間点滴静注
	生食注250mL	1袋		
	注射用水100mL	溶解用		
Rp.3	生食注50mL	1V	d3	5分点滴静注