

基本情報

レジメンコード	114011		
レジメン名	DKd療法(1サイクル目)		
癌腫	再発又は難治性の多発性骨髄腫		
申請診療科	血液内科	1サイクルの期間	28日間
併用内服薬	モンテルカスト10mg(d1,2,8,15,22:前投薬開始時)、カロナール900mg(d1,2,8,15,22:ダラザレックス投与15分前)、レナデックス20mg(d9,15)		
注意事項			

薬剤情報

滴下順	薬剤名	投与量	投与日	投与方法
Rp.1	生食注50mL	1V	d1,2	20分点滴静注 *ダラザレックス 投与3時間前
	デキサート注射液6.6mg/2mL	3V		
Rp.2	ヘパリンNaロック用シリンジ1000単位/10mL	1筒	d1,2	
Rp.3	生食注50mL	1V	d1,2	20分点滴静注 *ダラザレックス 投与1時間前
	ポララミン注5mg/1mL	1A		
Rp.4	カiproリス注	20mg/m ²	d1,2	30分点滴静注
	注射用水20mL	溶解用		
	5%ブドウ糖注射液100mL	1V		
Rp.5	生食注50m	1V	d1,2	10分点滴静注
Rp.6	ダラザレックス注	8mg/kg	d1,2	50mL/h →100mL/h →150mL/h →以後200mL/h *フィルター使用
	生食注500mL	1袋		

Rp.7	生食注50mL	1V	d1,2	15分点滴静注
Rp.1	生食注50mL	1V	d3	20分点滴静注 *ダラザレックス 投与3時間前
	デキサート注射液6.6mg/2mL	6V		
Rp.2	ヘパリンNaロック用シリンジ1000単位/10mL	1筒	d3	
Rp.3	生食注50mL	1V	d3	20分点滴静注 *ダラザレックス 投与1時間前
	ポララミン注5mg/1mL	1A		
Rp.4	カイプロリス注	56mg/m ²	d3	30分点滴静注
	注射用水100mL	溶解用		
	5%ブドウ糖注射液100mL	1V		
Rp.5	生食注50m	1V	d3	10分点滴静注
Rp.6	ダラザレックス注	16mg/kg	d3	50mL/h →100mL/h →150mL/h →以後200mL/h *フィルター使用
	生食注500mL	1袋		
Rp.7	生食注50mL	1V	d3	15分点滴静注

Rp.1	生食注50mL	1V	d8,15	20分点滴静注 *ダラザレックス 投与3時間前
	デキサート注射液6.6mg/2mL	3V		
Rp.2	ヘパリンNaロック用シリンジ1000単位/10mL	1筒	d8,15	
Rp.3	生食注50mL	1V	d8,15	20分点滴静注 *ダラザレックス 投与1時間前
	ポララミン注5mg/1mL	1A		
Rp.4	カイプロリス注	56mg/m ²	d8,15	30分点滴静注
	注射用水20mL	溶解用		
	5%ブドウ糖注射液100mL	1V		
Rp.5	生食注50m	1V	d8,15	10分点滴静注

Rp.6	ダラザレックス注	16mg/kg	d8,15	50mL/h
	生食注500mL	1袋		→100mL/h →150mL/h
Rp.7	生食注50mL	1V	d8,15	15分点滴静注

Rp.1	生食注50mL	1V	d9,16	15分点滴静注
Rp.2	カiproリス注	56mg/m ²	d9,16	30分点滴静注
	注射用水20mL	溶解用		
	5%ブドウ糖注射液50mL	1V		
Rp.3	生食注50mL	1V	d9,16	15分点滴静注

Rp.1	生食注50mL	1V	d22	20分点滴静注 *ダラザレックス 投与1時間前
	デキサート注射液6.6mg/2mL	6V		
Rp.2	ヘパリンNaロック用シリンジ1000単位/10mL	1筒	d22	
Rp.3	ダラザレックス注	16mg/kg	d22	50mL/h →100mL/h →150mL/h →以後200mL/h *フィルター使用
	生食注500mL	1袋		
Rp.4	生食注50mL	1V	d22	15分点滴静注