

基本情報

|         |   |          |      |
|---------|---|----------|------|
| レジメンコード | 114013  |          |      |
| レジメン名   | DKd療法(3~6サイクル目)   |          |      |
| 癌腫      | 再発又は難治性の多発性骨髄腫  |          |      |
| 申請診療科   | 血液内科  | 1サイクルの期間 | 28日間 |
| 併用内服薬   | モンテルカスト10mg(d1,15:前投薬開始時)、カロナール900mg(d1,15.:ダラザレックス投与15分前)、レナデックス20mg(d2,8,9,16,22) |          |      |
| 注意事項    |   |          |      |

薬剤情報

| 滴下順  | 薬剤名                       | 投与量                 | 投与日   | 投与方法                           |
|------|---------------------------|---------------------|-------|--------------------------------|
| Rp.1 | 生食注50mL                   | 1V                  | d1,15 | 20分点滴静注<br>*ダラザレックス<br>投与3時間前  |
|      | デキサート注射液6.6mg/2mL         | 3V                  |       |                                |
| Rp.2 | ヘパリンNaロック用シリンジ1000単位/10mL | 1筒                  | d1,15 |                                |
| Rp.3 | 生食注50mL                   | 1V                  | d1,15 | 20分点滴静注<br>*ダラザレックス<br>投与1時間前  |
|      | ポララミン注5mg/1mL             | 1A                  |       |                                |
| Rp.4 | カイトロリス注                   | 56mg/m <sup>2</sup> | d1,15 | 30分点滴静注                        |
|      | 注射用水100mL                 | 溶解用                 |       |                                |
|      | 5%ブドウ糖注射液100mL            | 1V                  |       |                                |
| Rp.5 | 生食注50m                    | 1V                  | d1,15 | 10分点滴静注                        |
| Rp.6 | ダラザレックス注                  | 16mg/kg             | d1,15 | 50mL/h<br>→100mL/h<br>→150mL/h |
|      | 生食注500mL                  | 1袋                  |       |                                |

|      |                |                     |           |         |
|------|----------------|---------------------|-----------|---------|
| Rp.7 | 生食注50mL        | 1V                  | d1,15     | 15分点滴静注 |
| Rp.1 | 生食注50mL        | 1V                  | d2,8,9,16 | 15分点滴静注 |
| Rp.2 | カiproリス注       | 56mg/m <sup>2</sup> | d2,8,9,16 | 30分点滴静注 |
|      | 注射用水100mL      | 溶解用                 |           |         |
|      | 5%ブドウ糖注射液100mL | 1V                  |           |         |
| Rp.3 | 生食注50mL        | 1V                  | d2,8,9,16 | 15分点滴静注 |