

基本情報

|         |   |          |      |
|---------|---|----------|------|
| レジメンコード | 114014  |          |      |
| レジメン名   | DKd療法(7サイクル目以降)   |          |      |
| 癌腫      | 再発又は難治性の多発性骨髄腫  |          |      |
| 申請診療科   | 血液内科  | 1サイクルの期間 | 28日間 |
| 併用内服薬   | モンテルカスト10mg(d1:前投薬開始時)、カロナール900mg(d1.:ダラザレックス投与15分前)、レナデックス20mg(d2,8,9,15,16,22,23) |          |      |
| 注意事項    |   |          |      |

薬剤情報

| 滴下順  | 薬剤名                       | 投与量                 | 投与日 | 投与方法                          |
|------|---------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| Rp.1 | 生食注50mL                   | 1V                  | d1  | 20分点滴静注<br>*ダラザレックス<br>投与3時間前 |
|      | デキサート注射液6.6mg/2mL         | 3V                  |     |                               |
| Rp.2 | ヘパリンNaロック用シリンジ1000単位/10mL | 1筒                  | d1  |                               |
| Rp.3 | 生食注50mL                   | 1V                  | d1  | 20分点滴静注<br>*ダラザレックス<br>投与1時間前 |
|      | ポララミン注5mg/1mL             | 1A                  |     |                               |
| Rp.4 | カiproリス注                  | 56mg/m <sup>2</sup> | d1  | 30分点滴静注                       |
|      | 注射用水20mL                  | 溶解用                 |     |                               |
|      | 5%ブドウ糖注射液100mL            | 1V                  |     |                               |
| Rp.5 | 生食注50m                    | 1V                  | d1  | 10分点滴静注                       |

|      |          |         |    |                     |
|------|----------|---------|----|---------------------|
| Rp.6 | ダラザレックス注 | 16mg/kg | d1 | 50mL/h              |
|      | 生食注500mL | 1袋      |    | →100mL/h            |
| Rp.7 | 生食注50mL  | 1V      | d1 | →150mL/h<br>15分点滴静注 |

|      |               |                     |              |         |
|------|---------------|---------------------|--------------|---------|
| Rp.1 | 生食注50mL       | 1V                  | d2,8,9,15,16 | 15分点滴静注 |
| Rp.2 | カiproリス注      | 56mg/m <sup>2</sup> | d2,8,9,15,16 | 30分点滴静注 |
|      | 注射用水20mL      | 溶解用                 |              |         |
|      | 5%ブドウ糖注射液50mL | 1V                  |              |         |
| Rp.3 | 生食注50mL       | 1V                  | d2,8,9,15,16 | 15分点滴静注 |