

基本情報

レジメンコード	114017		
レジメン名	DKd療法(3~6サイクル目)75歳以上		
癌腫	再発又は難治性の多発性骨髄腫		
申請診療科	血液内科	1サイクルの期間	28日間
併用内服薬	モンテルカスト10mg(d1,15:前投薬開始時)、カロナール900mg(d1,15.:ダラザレックス投与15分前)、レナデックス20mg(d8,22)		
注意事項	ダラザレックス：フィルター付きルート使用		

薬剤情報

滴下順	薬剤名	投与量	投与日	投与方法
Rp.1	生食注50mL	1V	d1,15	20分点滴静注 *ダラザレックス 投与3時間前
	デキサート注射液6.6mg/2mL	3V		
Rp.2	ヘパリンNaロック用シリンジ1000単位/10mL	1筒	d1,15	
Rp.3	生食注50mL	1V	d1,15	20分点滴静注 *ダラザレックス 投与1時間前
	ポララミン注5mg/1mL	1A		
Rp.4	カイプロリス注	56mg/m ²	d1,15	30分点滴静注
	注射用水100mL	溶解用		
	5%ブドウ糖注射液100mL	1V		
Rp.5	生食注50m	1V	d1,15	10分点滴静注
Rp.6	ダラザレックス注	16mg/kg	d1,15	50mL/h →100mL/h →150mL/h
	生食注500mL	1袋		

Rp.7	生食注50mL	1V	d1,15	15分点滴静注
Rp.1	生食注50mL	1V	d2,8,9,16	15分点滴静注
Rp.2	カiproリス注	56mg/m ²	d2,8,9,16	30分点滴静注
	注射用水20mL	溶解用		
	5%ブドウ糖注射液50mL	1V		
Rp.3	生食注50mL	1V	d2,8,9,16	15分点滴静注