

基本情報

|         |                                       |          |     |
|---------|---------------------------------------|----------|-----|
| レジメンコード | 130108                                |          |     |
| レジメン名   | アービタックス+PF(シスプラチン100+5FU)療法 (2コース目以降) |          |     |
| 癌腫      | 頭頸部癌                                  |          |     |
| 申請診療科   | 耳鼻咽喉科                                 | 1サイクルの期間 | 21日 |
| 併用内服薬   | アプレピタント125mg(d1)、アプレピタント80mg(d2-3)    |          |     |
| 注意事項    |                                       |          |     |

薬剤情報

| 滴下順  | 薬剤名   | 投与量 | 投与日 | 投与方法・留意事項  |
|------|-------|-----|-----|------------|
| Rp.1 | 生食注1L | 1袋  | d0  | 翌日までルートキープ |

|      |                        |                      |    |           |
|------|------------------------|----------------------|----|-----------|
| Rp.1 | KCL注20mEqキット20mEq/20mL | 1キット                 | d1 | 2時間点滴静注   |
|      | 硫酸Mg注射液20mEq/20mL      | 1A                   |    |           |
|      | 生食注500mL               | 1袋                   |    |           |
| Rp.2 | 生食注250mL               | 1袋                   | d1 | 30分点滴静注   |
| Rp.3 | アロキシ静注0.75mg/5mL       | 1V                   | d1 | 30分点滴静注   |
|      | デキサート注射液6.6mg/2mL      | 2V                   |    |           |
|      | ポララミン注5mg/1mL          | 1A                   |    |           |
|      | 生食注100mL               | 1V                   |    |           |
| Rp.4 | アービタックス注               | 250mg/m <sup>2</sup> | d1 | 1時間点滴静注   |
|      | 生食注250mL               | 1袋                   |    |           |
| Rp.5 | 生食注100mL               | 1V                   | d1 | 30分以上点滴静注 |

|      |                |                       |    |          |
|------|----------------|-----------------------|----|----------|
| Rp.6 | シスプラチン注        | 100mg/m <sup>2</sup>  | d1 | 2時間点滴静注  |
|      | 生食注500mL       | 1袋                    |    |          |
| Rp.7 | フロセミド注20mg/2mL | 1A                    | d1 | 側管より静注   |
| Rp.8 | フルオロウラシル注      | 1000mg/m <sup>2</sup> | d1 | 24時間点滴静注 |
|      | 生食注1L          | 1袋                    |    |          |
| Rp.9 | 生食注1L          | 1袋                    | d1 | 4時間点滴静注  |

|      |                   |                       |      |          |
|------|-------------------|-----------------------|------|----------|
| Rp.1 | デキサート注射液6.6mg/2mL | 1V                    | d2.3 | 20分点滴静注  |
|      | 生食注100mL          | 1V                    |      |          |
| Rp.2 | フルオロウラシル注         | 1000mg/m <sup>2</sup> | d2.3 | 24時間点滴静注 |
|      | 生食注1L             | 1袋                    |      |          |
| Rp.3 | 生食注1L             | 1袋                    | d2.3 | 日中で投与    |

|      |                   |                       |    |          |
|------|-------------------|-----------------------|----|----------|
| Rp.1 | デキサート注射液6.6mg/2mL | 1V                    | d4 | 20分点滴静注  |
|      | 生食注100mL          | 1V                    |    |          |
| Rp.2 | フルオロウラシル注         | 1000mg/m <sup>2</sup> | d4 | 24時間点滴静注 |
|      | 生食注1L             | 1袋                    |    |          |
| Rp.3 | 生食注50mL           | 1V                    | d4 | 抜針時に使用   |

|      |                   |                      |       |         |
|------|-------------------|----------------------|-------|---------|
| Rp.1 | デキサート注射液6.6mg/2mL | 2V                   | d8.15 | 30分点滴静注 |
|      | ポララミン注5mg/1mL     | 1A                   |       |         |
|      | 生食注100mL          | 1V                   |       |         |
| Rp.2 | アービタックス注          | 250mg/m <sup>2</sup> | d8.15 | 1時間点滴静注 |
|      | 生食注250mL          | 1袋                   |       |         |
| Rp.3 | 生食注100mL          | 1V                   | d8.15 | 30分点滴静注 |