

基本情報

レジメン名	DBd療法1サイクル目(1~3週)		
癌腫	多発性骨髄腫		
申請診療科	血液内科	1サイクルの期間	21日間
併用内服薬	モンテルカスト10mg(d1.8.15:前投薬開始時)・カロナール900mg(d1.8.15:ダラザレックス投与15分前)、 レナデックス20mg(2.4.5.9.11.12)		
注意事項			

薬剤情報

滴下順	薬剤名	投与量	投与日	投与方法
Rp.1	生食注50mL	1V	d1	20分点滴静注 *ダラザレックス 投与3時間前
	デキサート注射液6.6mg/2mL	3V		
Rp.2	ヘパリンNaロック用シリンジ1000単位/10mL	1筒	d1	
Rp.3	生食注50mL	1V	d1	20分点滴静注 *ダラザレックス 投与1時間前
	ポララミン注5mg/1mL	1A		
Rp.4	生食注100mL	1V	d1	40分点滴静注
Rp.5	ベルケイド注	1.3mg/m ²	d1	皮下注
	生食注20mL	溶解用		
Rp.6	ダラザレックス注	16mg/kg	d1	50mL/h →100mL/h →150mL/h →以後200mL/h *フィルター使用
	生食注1L	1袋		

Rp.7	生食注50mL	1V	d1	15分点滴静注
Rp.1	ベルケイド注	1.3mg/m ²	d4.11	皮下注
	生食注20mL	溶解用		
Rp.1	生食注50mL	1V	d8	20分点滴静注 * ダラザレックス 投与3時間前
	デキサート注射液6.6mg/2mL	3V		
Rp.2	ヘパリンNaロック用シリンジ1000単位/10mL	1筒	d8	
Rp.3	生食注50mL	1V	d8	20分点滴静注 * ダラザレックス 投与1時間前
	ポララミン注5mg/1mL	1A		
Rp.4	生食注100mL	1V	d8	40分点滴静注
Rp.5	ベルケイド注	1.3mg/m ²	d8	皮下注
	生食注20mL	溶解用		
Rp.6	ダラザレックス注	16mg/kg	d8	50mL/h →100mL/h →150mL/h →以後200mL/h *フィルター使用
	生食注500mL	1袋		
Rp.7	生食注50mL	1V	d8	15分点滴静注
Rp.1	生食注50mL	1V	d15	20分点滴静注 * ダラザレックス 投与1時間前
	デキサート注射液6.6mg/2mL	3V		
	ポララミン注5mg/1mL	1A		
Rp.2	生食注100mL	1V	d15	40分点滴静注
Rp.3	ダラザレックス注	16mg/kg	d15	100mL/h →150mL/h →以後200mL/h *フィルター使用
	生食注500mL	1袋		
Rp.4	生食注50mL	1V	d15	15分点滴静注